

ESBERITOX®N

biljni imunostimulans

Odavno je poznato da neke ljekovite biljke djeluju stimulatивно i pomažu našem obrambenom sustavu. Ekstrakti dobiveni iz korijena sunčanice (*Echinaceae purpureae radix*, *Echinaceae pallidae radix* 1+1), korijena divljeg indiga (*Baptisia tinctoriae radix*) i zeleni tuje (*Thujae occidentalis herba*) ukomponirani u jedinstvenu biljnu kombinaciju čine sastav biljnog lijeka **Esberitox®N**.

Esberitox®N djeluje imunostimulatивно preko različitih mjesta djelovanja na raznim nivoima imunološkog sustava kao i antivirusno (aktivne tvari u ekstraktima ehinaceje i tuje zaustavljaju razmnožavanje virusa).



Proizvod jača obrambene snage organizma pa vam savjetujemo da ga uzmete kad očekujete mogućnost infekcije, a želite smanjiti vjerojatnost mogućeg oboljenja.

Preporuča se uzeti **Esberitox® N** pri prvim znakovima prehlade. Tegobe će tada biti slabije izražene a trajanje bolesti kraće, te će opasnost od recidiva i komplikacija biti znatno manja.

Neke od prednosti Esberitox®N su:

- ▶ djelotvornost dokazana brojnim pretkliničkim i kliničkim ispitivanjima,
- ▶ dobra podnošljivost,
- ▶ nisu poznate interakcije s drugim lijekovima,
- ▶ velika sigurnost uporabe,
- ▶ dva farmaceutska oblika: tablete s vitaminom C ugodnog su okusa (može ih se uzeti i bez tekućine – otapaju se u ustima) i otopina (kapi),
- ▶ doziranje je prilagođeno dobi (novorođenčad, djeca i odrasli),
- ▶ kliničke studije su pokazale da jedinstvena kombinacija ehinaceje, divljeg indiga i tuje u Esberitox®N, uzrokuje i do 80 % jači imunostimulirajući učinak u odnosu na monopreparate (dolazi do pozitivnog sinergizma među sastojcima).

Sastav Otopina: 1 ml otopine sadrži: **Djelatne tvari:** 0,43 ml alkoholno-vodenog ekstrakta (1:11) zeleni tuje (*Thujae occidentalis herba*), 4 mg korijena sunčanice (*Echinaceae purp./pallid. radix* 1+1), 15 mg korijena divljeg indiga (*Baptisia tinctoriae radix*) 20 mg. Ekstrakcijsko sredstvo: etanol 30 % (V/V). **Pomoćne tvari:** etanol, pročišćena voda, boja karamel (E 150). Otopina sadrži 29 % (V/V) etanola. **Tablete:** 1 tableta sadrži: **Djelatne tvari:** 0,215 ml alkoholno-vodenog ekstrakta (1:11) zeleni tuje (*Thujae occidentalis herba*), 2 mg, korijena sunčanice (*Echinaceae purp./pallid. radix* 1+1) 7,5 mg, korijena divljeg indiga (*Baptisia tinctoriae radix*) 10 mg. Ekstrakcijsko sredstvo: etanol 30 % (V/V). **Pomoćne tvari:** askorbinska kiselina, laktoza, magnezijev stearat, makrogol, saharoza.

Indikacije za uzimanje Esberitox®N su :

- ▶ obična prehlada,,
- ▶ popratna terapija uz antibiotike kod težih bakterijskih infekcija dišnih puteva (angina, faringitis, bronchitis, sinusitis, otitis media),
- ▶ sklonost infekcijama zbog privremeno oslabljenog imunološkog sustava.

Esberitox®N može se primijeniti i kod:

- ▶ herpes simplex labialis-a,
- ▶ bakterijskih upala kože,
- ▶ leukopenije kao posljedice terapije zračenjem i citostaticima.

Važno je znati da Esberitox®N ne samo da pomažu u prevenciji infekcija, već također u liječenju, ublažavajući simptome i skraćujući trajanje bolesti. To vrijedi i za djecu i za odrasle.

Kontraindikacije Poznata preosjetljivosti na bilo koji od djelatnih ili pomoćnih sastojaka ili na cvjetove biljnih vrsta iz porodice glavočika, *Asteraceae (Compositae)*. Iz načelnih razloga ne koristiti kod progresivnih sistemskih bolesti kao što su tuberkuloza, leukoza (leukemija), kolagenoza (upalna oboljenja vezivnog tkiva), multipla skleroza, i drugih autoimunih bolesti., te kod AIDS-a i zaraze HIV-om.

Nuspojave U pojedinim slučajevima može doći do reakcija preosjetljivosti. Zapaženo je da kod uzimanja preparata koji sadrže pripravke sunčanice može doći do kožnog osipa, svrbeži, rijetko do otekline lica, ponestajanja daha, vrtoglavice i pada krvnog tlaka.

Mjere opreza Esberitox® N otopina u pojedinačnoj dozi (50 kapi) sadrži 0,8 g alkohola i stoga se ne smije davati alkoholičarima.

Interakcije Interakcije s drugim lijekovima ili drugi oblici interakcija nisu poznate.

Posebna upozorenja Trudnoća i dojenje: za vrijeme trudnoće i dojenja Esberitox® N može se koristiti samo nakon konzultacije s liječnikom. Utjecaj na sposobnost upravljanja vozilima i strojevima: Ako se Esberitox® N uzima kako je propisano, ne očekuje se da će sposobnost upravljanja vozilima i strojevima biti smanjena.

Pakiranje 50 tableta (5x10) u blister pakiranju, u kartonskoj kutiji

100 tableta (5x20) u blister pakiranju, u kartonskoj kutiji

20 ml otopine u staklenoj bočici-kapaljki, u kartonskoj kutiji

50 ml otopine u staklenoj bočici-kapaljki, u kartonskoj kutiji

Način primijene:

Odrasli i djeca starija od 12 godina:

3 puta dnevno 3 tablete ili 50 kapi.

Djeca od 6 do 12 godina:

3 puta dnevno 2 tablete ili 25 kapi.

Djeca od 1 do 6 godina:

3 puta dnevno 1-2 tablete ili 15 kapi.

Dojenčad:

3 puta dnevno 1 tableta ili 10 kapi.

